



ALLEGATO C

Prescrizione preparazioni magistrali a base di Cannabis sativa

ASL:	Centro Prescrittore:
Codice Medico:	Recapito telefonico:
Codice Paziente:	
ASL residenza:	Data prescrizione:

Prescrizione

Materia Prima	Cartine	Olio
CANNABIS FLOS 19% THC (Bedrocan®)		
CANNABIS FLOS 6% THC, 8% CBD (Bediol®)		
CANNABIS FLOS <1% THC, 9% CBD (Bedrolite®)		
FM 2 – Istituto Chimico Farmaceutico, Firenze		
FM 19 - Istituto Chimico Farmaceutico, Firenze		

Posologia

Cartine		
Quantitativo (mg) di una singola cartina	Numero Cartine	Quantitativo totale (mg)

Modalità di assunzione

1 cartinavolte al dì (dose/die) per via orale o inalatoria


Olio	
Quantitativo in grammi in 1 ml di olio d'oliva	
<i>Estrazione oleosa secondo la metodica indicata nell'articolo scientifico pubblicato da Luigi L. Romano e Arno Hazekamp, 2013 – Protocollo 5</i>	

Modalità di assunzione

Numero gocce: pure o diluite volte al dì per via orale



Motivo della prescrizione



Ministero della Sanità
ATO 52

Indicazioni terapeutiche a carico del SSR	
	Riduzione del dolore associato a spasticità (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) con resistenza alle terapie convenzionali in pazienti affetti da sclerosi multipla con punteggio scala NRS ≥ 5
	Riduzione del dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno, esclusa la fibromialgia) in pazienti con resistenza a trattamenti convenzionali (come da linee guida delle principali Società Scientifiche) e punteggio scala NRS ≥ 6
	Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard
Altre indicazioni terapeutiche approvate dal Ministero della Salute	
	Analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali (anche con punteggio scala NRS <5)
	Analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace (anche con punteggio scala NRS <6)
	Effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali
	Effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard
	Effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali

Timbro e Firma del Medico Prescrittore

PARTE RISERVATA ALLA FARMACIA

Prep. N°.	
Data di scadenza	
Data di consegna	
Costo della preparazione galenica	€

Timbro e Firma Farmacia

Reso cartine non utilizzate N°	Data:.....
Motivazione:.....	

